



AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

BOURGOGNE et FRANCHE-COMTE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n°25 du 11/10/2000 - 2 pages

Colza

Stades : de B4 à B8 (8 feuilles). Quelques rares parcelles sont au stade 2-3 feuilles.

Ravageurs

Des débuts de vol de **charançon du bourgeon terminal** sont ponctuellement observés sur certains secteurs (Tableau ci-contre).

Cependant, les captures restent généralement éparses et faibles (1 ou 2 captures par cuvette). Le vol n'a donc pas réellement débuté pour l'ensemble des secteurs et les conditions météorologiques annoncées pour la semaine à venir risquent d'être peu favorables au vol de charançons.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler le niveau très bas des dégâts de charançons du bourgeon terminal observé dans les zones non traitées des parcelles de notre réseau pour les automnes 98 et 99. En 1999, aucune larve de charançon n'a été détectée lors des dissections de pétioles y compris sur des parcelles ayant cumulé jusqu'à plus de 120 captures. Les captures de **grosses altises** se poursuivent mais restent de faible ampleur. Elles ne suscitent pas d'inquiétudes étant donné les stades des cultures.

Les populations de **pucerons** sont en forte régression en Saône et Loire, dans l'Yonne et en Franche-Comté. Elles sont encore importantes dans certains secteurs de Côte d'Or mais tendent à se stabiliser.

« Nous ne préconisons pas d'intervention insecticide cette semaine. Surveiller cependant les colzas les plus tardifs (<4 feuilles) qui peuvent encore être colonisés. »

Phoma

Des projections significatives d'ascospores de phoma ont été observées dans nos pièges au cours de ces derniers jours notamment sur les postes de Donzy (58), Cugney (70) et St Aubin (39) où l'on peut considérer que le premier pic de projections est en cours de réalisation. Il est probable que les pluies annoncées amplifieront le phénomène au cours de la semaine à venir.

Au vu des stades des colzas et de la climatologie du début de campagne, nous considérons le risque phoma comme faible pour l'ensemble des situations en variétés TPS (très peu sensible) ou PS (peu sensible).

Captures de Charançons du B.T. au 9/10

Communes	Captures du 9/10	Cumul de captures
Lux	0	1
Binges	2	2
Brazey en Plaine	0	0
Franxault	0	0
Lanthes	0	2
Chaux	5	6
21 Comblanchien	4	4
Quincey	1	2
Athie	1	1
Puits	0	0
Etalante	0	0
Prusly	0	0
Quemigny/Seine	0	0
25 Routelle	0	0
Amange	0	0
Annoire	0	1
Authume	0	0
39 Ruffey/Seille	1	1
St Aubin 1	1	1
St Aubin 2	0	0
Vaudrey	1	1
58 Pougny	1	1
Pouilly/Loire	1	1
Raveau	3	3
Sully la Tour	0	0
Bard les Pesmes	0	0
Cugney	1	1
70 Montureux	4	5
Oiselay	0	0
Valay	0	0
St Loup de la Salle	1	1
St Germain du Bois	0	0
St Maurice en Riv.	0	0
Meursanges	0	0
71 Lessard en Bresse	1	1
Fontaines	8	10
Clesse	0	0
Boyer	0	0
St Symphonien	0	0
Romenay	0	0
Bléneau	0	0
Auxerre	3	3
Pasilly	7	7
Chevannes	0	0
Noyers	0	0
Chablis	0	0
89 St Martin/Oreuse	0	0
Pont/Yonne	0	0
Courtoin	0	0
Ancy le Franc	0	0
Flogny la Chap.	1	1
Isle/Serein	0	0
Ravières	-	1

Colza

• Charançon du B.T. : encore des captures sans avoir réellement un vol.

• Pucerons souvent en recul.

Céréales

Quelques pucerons sur les semis précoces. Surveillez les parcelles dès la levée. Pas d'intervention actuellement.

Service Régional de la
Protection des Végétaux
ZI Nord - BP 177
21205 BEAUNE Cedex
Tél : 03.80.26.35.45
Fax : 03.80.22.63.85

Service Régional de la
Protection des Végétaux
Immeuble Orton
191, Rue de Belfort
25043 BESANCON Cedex
Tél : 03.81.47.75.70
Fax : 03.81.47.75.79

Imprimé à la station
D'Avertissements Agricoles
de Bourgogne
Directeur gérant : JC
RICHARD
Publication périodique
C.P.A.P n°1700 AD
ISSN n°0758-2374

Tarif Courrier et Fax : 380 F.

DB 4° Jo 43156

(B.T.
S&T)

P207

A l'heure actuelle, les situations les plus à risque seraient issues d'une combinaison de variété sensible, à un stade peu développé (<B5), et implantées sur des sols de type limons hydromorphes. De telles situations, qui pourraient éventuellement justifier une intervention actuellement, restent exceptionnelles sur la région.

Céréales

Stades : de semis en cours à 2-3 feuilles pour les semis très précoces ; les parcelles levées étaient cependant encore peu nombreuses en début de semaine.

Pucerons

Le vol de pucerons enregistré à la tour d'Auxerre reste modéré (voir graphique ci-contre).


En situations non traitées Gaucho, la présence de pucerons est le plus souvent comprise entre 0 et 2-3 % de pieds colonisés pour les parcelles à 1-2 feuilles.

Le suivi en pots-pièges (voir tableau ci-contre) montre un pouvoir virulifère moyen.

Quelques **cicadelles** peuvent être observées (notamment par beau temps) en situations favorables ; quelques captures sont également notées en cuvettes ; les niveaux observés restent modérés.

Aucune intervention insecticide n'est actuellement nécessaire ; commencer la surveillance des pucerons dès la levée.

Rester vigilant à l'égard du risque limaces.



JNO - résultats pots pièges - poste de Beaune

Période d'exposition	% de pots colonisés	% de plantes colonisées	Nbre de pucerons par pot	Nbre de pucerons par plante	% de pots infestés par le virus
13/09 - 21/09	42,5	17	1,2	0,3	4
21/09 - 28/09	66	27	2,4	0,6	7,3
28/09 - 5/10	56	21	2	0,4	Analyse en cours

* *
*